

Bulteriář - máme prvního bulteriáře

Přítelství s MVDr. Simonou Müllerovou - CHS Trojská 1/2
úterek, 06 listopad 2008

Asi ve třech měsících se udělá bulterierovi na hlavě mezi ušima malá lysinka. Mohou být i dvě, oddělené úzkým proužkem osrstěné kůže. Lysinky mají vejčitý tvar, jedna lysina je většinou kulatá velikosti mince. Tyto lysiny v 90% případů po roce zarostou, aniž byste jim věnovali pozornost. Zlepšení vzhledu kůže můžete docílit mazáním sádlem nebo jinou bylinkovou masťou. Rozhodně nemá žádný význam používat antibiotika, kortikoidy nebo dlat sekraby a kultivace na přítomnost patogenů. Vykultivujete maximálně bakteriální mikroflóru.

Na ocase asi 8 cm od kožene je žláza. Protože je bulterier mimořádně zmasilý a většinou nezaujme polohy typické pro jiné rasy, sedí si na této žláze a vzniká otlak. Kůže olysá, je edá a zbytnělá. V horším případě může dojít k infekci popraskané kůže, ale skoro vždy jde jen o vadu osrstění. Prevence a léčba spoívá v bulteriára do peřin, aby seděl na měkkém a hlubokém podkladě. Opět můžete otlak ošetřovat sádlem nebo bylinkovou masťou. Většina gaučových bulterierů tento problém nemá.

Pokud je váš pes zdravý a v kondici, žádný zkušební rozhodčí na výstavě vám nevytkne lysinku na hlavě a osezenou ocasní žlázu. Jiná situace je, když pes má otlaky na loktech, kolenou, patách, dokonce infikované a zhnisané. Takový pes je zjevně zanedbaný a vyžaduje veterinární ošetření a více péče z vaší strany.

Mladý bulteriér je velice choulostivý na onemocnění stáve. Narozdíl od RTW, pit nebo retrívér nemá tendence k parvovirovému onemocnění, ale bičkovci Guardie (Lambliie) mu způsobí dlouhodobé, recidivující potíže. Rovněž astrokryptosporidie.

Léčba nebývá příliš efektivní, nejlépe pomůže čas. Až si vytvoří vlastní imunitu. Onemocnění jako stávidavé průjmy, často s krví, bez změny celkového stavu a bez změny chuti k jídlu. Průjmy trvají alespoň 3 týdny na kdy několik měsíců.

Bez nespécifické léčby by došlo k závažnému poškození stáve a k možnosti další infekce, která už má větší pravděpodobnost, případně ohrozí život.

Nejdůležitější je správná životospráva. Je vhodné se držet zkušeností svého lékaře, protože moje postupy jsou odlišné od většiny kolegů. Jsem zásadním zastáncem klasické stravy, případně kombinované. Psa by měl léčit jeden lékař, kterého byste měli bez výhrad poslouchat a nezkoušet vlastní nápady.

Já používám upravenou klasickou stravu, byliny, homeopatika a v těžších případech i alopatickou léčbu.

Vynikající prevence je od odběru (od přikrmování u chovatele) používat makrobiotika nebo probiotika a krmné doplňky stabilizaci střevní mikroflóry. Trošku otrub nebo jiné vlákniny, krátce vařený ječmen, banány, Probian pulvis, Ecovit, Hefe enzym, Pabu. Krmit stále dokola stejné druhy potravin, což u mne znamená denně aspoň kousek mléčného výrobku, trochu syrového masa, drobek ovoce, zeleniny a uhlohydráty. Přestávku mezi určitou skupinou potravy udělat nanejvýš jednodenní. Špatně je například 6 dní v týdnu vařené maso a v neděli syrové, 6 dní granule a v neděli maso (toto jsou konkrétní případy), tvaroh 1x týdně. Lepší je 1 lžíce tvarohu denně, aspoň sousto masa denně.

Jedna drobnost pro odběry, i když se netýká zdraví. Devadesát procent bulterierů asi 2 měsíce odmítá chodit na vodítku. I když ho potáhnete, až mu do krve rozedáte prsty, i když mu nažijete, nepjde. Možná s jiným psem vám ne. Trénujte trpělivost. Až budete mít dítě nebo staré rodiče, bude se vám to hodit.

Toto byly tři nejdůležitější problémy malého bulteriera.

Informace a foto poskytla MVDr. Simona Müllerová - CHS Trojský káždě zdroj: mazlicci.cz